



PRAKTIJK PRINS HENDRIKSTRAAT

Koning & Mandema | Mooij | Turenhout | Postma | Schepers

lijst chronische fysiotherapie 2017

1. Aandoeningen van het zenuwstelsel:
 - cerebrovasculair accident;
 - ruggenmergaandoening;
 - multipole sclerose;
 - perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 - extrapyramidale aandoening;
 - motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 - aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 - cerebellaire aandoening;
 - uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 - radiculair syndroom met motorische uitval. De maximale behandelduur is drie maanden;
 - spierziekte;
 - myasthenia gravis;
2. Aandoeningen van het bewegingsapparaat
 - aangeboren afwijking;
 - progressieve scoliose;
 - juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 - reflexdystrofie;
 - fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 - frozen shoulder (capsulitis adhaesiva). De maximale behandelduur is twaalf maanden;
 - hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 - collageenziekten;
 - status na amputatie;
 - whiplash. De maximale behandelduur is drie maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden;
 - postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal drie maanden;
 - fracturen als deze conservatief worden behandeld. De maximale behandelduur is zes maanden na conservatieve behandeling;